

Vilde dyr, du kan opleve i

BRØNDERSLEV KOMMUNE



ALMINDELIG BLÅFUGL



BLÅ LIBEL



BØLLEBLÅFUGL



DÅDYR




EGERN



FUGLEKONGE



GRÆVLING



GRØNSPÆTTE



GUL VIPSTJERT



HAVØRN



HVEPSEVÅGE



KRONDYR




MUSVÅGE



RÆV



RØD GLENTE



RÅDYR



STOR KEJSERGULDSMED



TOPPET SKALLESLUGER

Vilde dyr, du kan opleve i

BRØNDERSLEV KOMMUNE

Agriades optilete

Bølleblåfuglen er moderat truet og relativt sjælden i Danmark. Dog kan den ses i Sømosen. Hannen er blå-violet på oversiden, mens hunnen er brunlig med blå bestøvning. Undersiden har en karakteristisk blåkernet plet. Vingefanget er 25-30 mm, og bølleblåfuglen er på vingerne fra først i juni til midten af juli.

BØLLEBLÅFUGL

Libellula depressa

Den kraftigste og bredeste af libel i Danmark. Krops-længden er 48-48 mm. Hos den kønsmodne han er bagkroppen blå, mens den hos unge individer og hunner er gul eller gulbrun. Der er tydelige gule sidepletter langs bagkroppen. Blå libel er på vingerne fra midten af maj til starten af august.

BLÅ LIBEL

Polyommatus icarus

Vingefanget er 24-32 mm. Ses fra først i maj til sidst i september. Hannens overside er lys blå med en lysere kant på forvingen. Hunnen er ofte brun med varierende blå bestøvning. Bagsiden er grålig og har orange sømmåner og sorte pletter. Larverne ligner bænkebidere.

ALMINDELIG BLÅFUGL

Regulus regulus

Danmarks mindste fugl, som måler mellem 8,5-9,5 cm fra næb til halespids. Både hanner og hunner har en ”kongekrone”: Et gult bånd på toppen af hovedet. Oversiden af fjerpragten er grønlig og vingerne sorte og grønne med hvidt vingebånd. Kan ses året rundt. Fuglekongen lever hovedsageligt af insekter.

FUGLEKONGE

Sciurus vulgaris

Egernets krop er 19-24 cm langt med en næsten lige så lang hale, som er stor og busket. Egernet bruger halen til at holde balancen med. Ørerne er smalle og strittede. Der findes både røde, mørkebrune og sorte egern, men fælles for alle er den hvide bug. Egernets føde består bl.a. af frø, nødder, frugt, kogler og bær, men også fugleunger, æg og larver. Egernet er fredet.

EGERN

Dama dama

Dådyret er den næststørste hjortart i Danmark, med en vægt på 35-100kg. Både lam og voksne dyr har hvide pletter på ryggen. Pletterne kan forsvinde i vinterpelsen. Farven kan variere, men er overvejende brunlig på ryggen og hvidlig foran på halsen. Dertil er dådyret den eneste danske hjortart med hvid bug og skovl på geviret, som fældes i maj.

DÅDYR

Motacilla flava

Mellem 15-16,5 cm fra næb til halespids. Hos hannerne er undersiden gul mens oversiden er olivengrøn, og hovedet blågråt med hvid stribe over øjet og under næbbet. Hunnen er lysere gul og hos unge fugle er undersiden beigefarvet. Lever af insekter som myg og fluer. Den gule vipstjert er en trækfugl, som kan ses fra sidst i april til først i oktober.

GUL VIPSTJERT

Picus viridis

Grønspætten er mellem 30-36 cm lang med et vingefang på mellem 45-51 cm. Grønspætten er grøn på oversiden med lys underside og en karakteristisk rød bane på hovedet samt sorte aftegninger i ansigtet. Unge fugle er mere spættede og knap så farvestrålende. Ofte ser man flagspætten på jorden, hvor den spiser myrer.

GRØNSPÆTTE

Meles meles

Danmarks næststørste rovdyr på land, kun overgået af ulven. Grævlingen vejer mellem 12-18 kg, og den er let genkendelig på det sorte hoved med hvide striber fra snude til ører. Grævlingen er mest aktiv om natten, hvor den snuser sig frem til føden. Den lever hovedsageligt af æg, museunger, insekter, snegle og padder. Grævlingen kan ses hele året.

GRÆVLING

Cervus elaphus

Krondyret er det største vildtlevende dyr i Danmark. I fri natur kan den voksne buk nå en vægt på 230kg, mens gennemsnitsvægten er 80-180 kg. Lammene har lyse pletter og striber til camouflage, som forsvinder hos de voksne dyr. Sommerpelsen er rødbrun og vinterpelsen er gråbrun. Krondyr lever i kønsopdelte flokke. Bukkene bærer gevir fra juli til februar.

KRONDYR

Pernis apivorus

Minder om musvågen, men har længere vinger og hale og et dueagtigt hoved. Farven varierer: Nogle fugle er næsten helt hvide, men andre er rød- og mørkebrune. Hvepsevågen er en almindelig trækgæst i Danmark og ses i anden halvdel af maj og sidst i august eller først i september. Hvepsevågen lever hovedsageligt af hvepselarver, men spiser også hvepse.

HVEPSEVÅGE

Haliaeetus albicilla

Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på hele 190-260 cm. Hunnen er ofte cirka en tredjedel større end hannen. Næbbet er stort og gult hos udvoksede fugle og mere gråligt hos unge fugle. En voksen havørn har et lyst hoved, mens unge fugle har en mere ensfarvet brun fjerdragt. Havørnen lever af ådsler, fisk og mellemstore fugle.

HAVØRN

Milvus milvus

Den røde glente er mellem 60-70 cm lang. Den har en smuk rustrød farve og en lang, kløftet hale. Når den markerer sin redeplads, kan den svæve stille over skoven i flere timer – som en drage. Glenten kan skelnes fra musvågen på sin kløftede hale, hvor musvågens er afrundet. I øvrigt er den røde glente ca. 25% større end musvågen.

RØD GLENTE

Vulpes vulpes

Længden varierer fra 66-70 cm. Hannen er større end hunnen. Ræve i Danmark er rødbrune med lys bug og de har en karakteristisk busket hale med hvid spids. Ørerne er store og trekantede. Lever af smånavere, ådsler, regnorme samt bær og frugter. Ræven er mest aktiv om natten.

RÆV

Buteo buteo

Musvågen er ca. 50-55 cm lang og har et vingefang på 110-130 cm. Musvågen er en af de mest almindelige rovfugle i Danmark, og man ser den ofte siddende på pæle, hvorfra den spejder efter føde. Nogle musvåger er helt mørke, mens andre er mere lyse. Musvågen er udbredt over hele landet. Lever hovedsageligt af gnavere, fugle, padder, insekter og ådsler.

MUSVÅGE

Mergus serrator

Den toppede skallesluger har en længde på mellem 52-58 cm. Den har fået sit navn efter den pjuksede top på hovedet. Hannens hoved er sort og grønligt, halskraven er hvid og brystet er brunligt. Hunnen har et mere brunligt hoved med flydende overgang til det lyse bryst. Øjnene er røde, og for enden af næbbet er der en lille krog. Ses hele året.

TOPPET SKALLESLUGER

Anax imperator

Den største guldsmed i Europa med en længde på mellem 66-84 mm. Udbredt over det meste af Danmark og kan findes ved moser, søer og andre vandhuller. Hannen har grønne og blå øjne, grøn forkrop og en blå bagkrop med sorte aftegninger. Hunnens bagkrop og øjne er mere grønlige. De er på vingerne fra juni til august.

STOR KEJSERGULDSMED

Capreolus capreolus

Med kun 20-30 kg er rådyret Danmarks mindste hjortart. Pelsen er rødbrun om sommeren og gråbrun om vinteren. Kun lammene har lyse pletter og striber til camouflage. Rådyret har en meget kort, lys hale på lys baggrund. I profil kan rådyret kendes på den let skrånende ryg, der hælder mod fronten af dyret, da bagbenene er længere end forbenene.

RÅDYR