

Planter, du kan opleve i

BRØNDERSLEV KOMMUNE



DYND-PADDEROK



ENG-KABBELEJE




ENGCARSE




HEDELYNG



HVID ANEMONE



HØNSEBÆR



KRAGEFOD




KÆRMYSSE



PRIKBLADET PERIKON




REJNFAN




RUNDBLADET SOLDUG




SALTURT




SKOV-GØGELILJE



SKOVSTJERNE



SMALBLADET KÆRULD



TRANEBÆR



VELLUGTENDE KAMILLE



STRANDASTERS

Planter, du kan opleve i

BRØNDERSLEV KOMMUNE

Cardamine pratensis

20-40 cm høj urt. Almindelig på enge og i grøftekanter. Vigtig for f.eks. grønbåret kålsommerfugl. Blomsternes farve varierer fra hvide til lyslilla med gule støvknapper og mørkere årer. Engkarse blomstrer fra maj-juni.

EN GKARSE

Caltha palustris

15-30 cm høj urt, der vokser i grøftekanter og på våde enge. Tuedannende, flerårig urt med gule kronblade og hjerteformede, mørkegrønne grundblade. Eng-kabbeleje blomstrer i april-maj.

ENG-KABBELEJE

Equisetum fluviatile

Flerårig sporeplante, der vokser i sumpe, damme, åer og våde enge. Skuddene er op til 125 cm høje, med kogleagtige sporehuse for enden. Sporehusene udvikles i juni-august. Planten har bittesmå blade på leddene, og stænglen er hul.

DYND-PADDEROK

Cornus suecica

Hønsebær er en nordligt voksende plante, der er sjælden i Danmark. Den blomstrer i maj-juni, hvor den sætter blomsterstande med mange små sortrøde blomster. Blomsterstandene er omgivet af 4 hvide svøblade. Udbredt i Grevsmosen og Slettingen.

HØNSEBÆR

Anemone nemorosa

Flerårig urt med 10-35 cm lange hårede stilke. Blomsten er hvid med 6-7 kronblade og gule støvdragere. Den hvide anemone blomstrer i april-maj, og dækker ofte skovbunden som et hvidt tæppe.

HVID ANEMONE

Calluna vulgaris

15-75 cm høj stedsegrøn dværgbusk. Vokser på heder, overdrev, i skove og højmoser. Hedelyng er vigtig for honningbier, som tiltrækkes af de nyudsprungne blomster. Bladene er små og nåleformede, blomsterne er klokkeformede og kan være hvide eller mørkerøde. Blomstrer fra juli-september.

HEDELYNG

Hypericum perforatum

Op til 50 cm høj etårig krydder- og lægeplante. I juni-august udvikler prikbladet perikon gule blomster, der indeholder et rødt farvestof. Siden oldtiden har planten været anset som en fremragende lægeplante, der blev brugt mod en lang række sygdomme.

PRIKBLADET PERIKON

Calla palustris

20-50 cm høj med krybende jordstilke. Bladene er hjerteformede, lysegrønne og blanke. Kærmysse har en karakteristisk gul blomsterstand omgivet af et hvidt hylsterblad. Om efteråret omdannes blomsterstanden til en kolbe af røde bær. Hele planten er giftig. Kærmysse blomstrer juni-juli. Kan bl.a. ses i Sømosen.

KÆRMYSSE

Comarum palustre

Flerårig plante i rosenfamilien. 30-80 cm høj urt, som ofte findes i hedemoser og ved bredden af næringsfattige søer. Blomstringen sker i juni-august. Kragefod har stjerneformede, rødbrune kronblade og svagt rødlig, finnede blade.

KRAGEFOD

Salicornia europaea

Kaldes også for kveller. 5-20 cm høj urt, der er tydeligt leddelt. Under blomstringen er planten rødlig, men ellers grøn. Urten vokser bl.a. på strandenge og kystnære mudderflader. Den tåler og kræver meget salt. Blomstrer i august og september.

SALTURT

Drosera rotundifolia

10-15 cm høj kødædende plante, som vokser på sur og næringsfattig bund. Grundbladene er rosetstillede og langstilkede med røde, klæbrige kirtelhår for enden. Når et insekt kommer i berøring med de klæbrige kirtelhår, lukker planten sig om og fortærer byttet. Blomstrer fra juni-august.

RUNDBLADET SOLDUG

Tanacetum vulgare

En rank, krydret duftende, 50-100 cm høj plante med fjersnitdelte blade og en tæt halvskærm af gule, knapliggende blomsterkurve. Den er almindelig langs vejkanter og markskel og på bakkeskrænter. Blomstrer fra juli-september. Rejnfan har været anvendt som ormedrivende middel i mange lande.

REJNFAN

Eriophorum angustifolium

15-60 cm høj med tynde, glatte stængler og smalle, flade blade. Vokser i højmoser, heder og på våde enge, og kan bl.a. ses i Sømosen, hvor den breder sig på hængesækken. Blomstrer fra april-maj. Efter blomstringen omdannes blomsterbladene til spinkle, hvide hår.

SMALBLADET KÆRULD

Trientalis europaea

Findes både i bøge- og nåleskov. Kronbladene er hvide og sidder taglagt. Midt i blomsten sidder et lysegrønt støvfang med syv støvdragere. Bladene er store og aflangt ovale, og de sidder samme sted på stænglen. Skovstjerne blomstrer i juni-juli, og det er Danmarks eneste syvttakkede blomst.

SKOVSTJERNE

Platanthera chlorantha

Skov-gøgelliljen er en fredet orkidé, der vokser i næringsrige løvskove, i krat, på enge og overdrev. Kan findes i området omkring Grevsmosen og Slettingen. Den blomstrer i juni og begyndelsen af juli, hvor den sætter flere små, hvide blomster. I dagtimerne er blomsterne stort set lugtløse - men om aftenen udskiller de en sød duft, der tiltrækker natsværmere.

SKOV-GØGELILJE

Aster tripolium

Flerårig urt, der tilhører kurvblomstfamilien. 15-60 cm høj, med glat, ofte rødlig stængel. Blomstrer fra juli-september. Vokser på strandenge og strandbrede og trives i salte omgivelser. Bladene er tykke og mørkegrønne. Violette eller blålige, smalle kronblade, med gul skivekrone i midten.

STRANDASTERS

Matricaria recutita

En etårig, op til 60 cm høj urt med stærk duft. I maj-august udvikler planten hvide kurveblomster med gul midte. Kamille har siden oldtiden været en meget benyttet lægeplante, der er blevet brugt mod en lang række forskellige sygdomme. Den er værdifuld mod lette smerter pga. indholdet af salicylsyre.

VELLUGTENDE KAMILLE

Vaccinium oxycoccos

4-8 cm høj, stedsegrøn dværgbusk. Stænglerne bliver op til en meter lange. Bladene er små, ægformede og mørkegrønne, og kronen er rosenrød med tilbagebøjede flige. Bærrene er mørkerøde med en bitter og syrlig smag. Almindelig i fattigkær og højmoser. Blomstrer fra april-maj.

TRANEBÆR